

Botox / Filler – Postoperative Vorsichtsmaßnahmen

Allgemeiner Verlauf & Vorsichtsmaßnahmen

- Die Wirkung von Botox kann sich manchmal bereits am nächsten Tag bemerkbar machen, zeigt sich in der Regel jedoch erst etwa 3 Tage nach der Behandlung und erreicht nach ungefähr 2–3 Wochen ihren Höhepunkt. Danach lässt die Wirkung allmählich nach, und nach etwa 1 Monat können leichte Mimikfalten wieder auftreten, wodurch das Ergebnis natürlicher wirkt.
- Nach einer Botox-Behandlung können lokal begrenzte Blutergüsse auftreten; diese klingen in der Regel innerhalb von 7–10 Tagen ab und sind kein Grund zur Sorge.
- Wenn Botox im Augenbereich angewendet wurde, sollten Sie sich nach dem Eingriff etwa 4 Stunden lang nicht hinlegen, um ein Herabhängen der Augenlider zu vermeiden.

Botox zur Faltenbehandlung

- Nach einer Behandlung im Augenbereich kann Ihr Lächeln anfangs leicht unnatürlich wirken.
- Botox in der Stirnregion kann ein Schweregefühl an den Augenbrauen, leichte Beschwerden beim Öffnen der Augen oder ein Absinken der Augenbrauen verursachen. Diese Beschwerden bessern sich in der Regel, sobald sich die Wirkung eingependelt hat.

Kieferbotox (Masseter-Muskel)

- Botox reduziert die Muskelaktivität. Beim Kieferbotox setzt die Wirkung nach etwa 3–4 Wochen ein und erreicht nach 2–3 Monaten ihren Höhepunkt.
- Falls eine zweite Behandlung erforderlich ist, wird diese in der Regel 4–6 Monate nach der ersten Behandlung durchgeführt. Bitte kommen Sie zum vereinbarten Termin, damit Ihr Zustand beurteilt und bei Bedarf eine zusätzliche Behandlung vorgenommen werden kann.
- Nach einer Kieferbotox-Behandlung sollten Sie Aktivitäten vermeiden, die die Kiefermuskulatur übermäßig beanspruchen – etwa Kaugummikauen oder das Essen



zäher Lebensmittel wie getrocknetem Tintenfisch oder Trockenfleisch –, damit das verringerte Muskelvolumen länger erhalten bleibt.

- In manchen Fällen kann sich die Kaukraft für etwa 1 Monat nach dem Eingriff vermindert anfühlen; dies normalisiert sich jedoch in der Regel mit der Zeit.

Filler

- Nach einer Filler-Behandlung können Blutergüsse auftreten; diese klingen meist innerhalb von 7–10 Tagen ab und sind kein Grund zur Sorge.
- Nehmen Sie verordnete Medikamente regelmäßig zu den vorgesehenen Zeiten ein.
- Nach Filler-Injektionen sind Schwellungen häufig; innerhalb von etwa 2 Wochen nimmt der behandelte Bereich jedoch die gewünschte Kontur an.
- Wenn Symptome wie Überwärmung, starke Schwellungen, anhaltende Schmerzen, Hautverfärbungen, Blasenbildung oder Pusteln auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend die Klinik und kommen Sie sofort vorbei.



Auf dieser
Seite



WhatsApp

+82 10 3141 4711 WhatsApp

B1, Aratower, 3, Seocho-daero 77-gil,
Seocho-gu, Seoul

consult@made-young.co

