

Botox / Produits de comblement Précautions postopératoires

Évolution générale et précautions

- Les effets du Botox peuvent parfois se faire sentir dès le lendemain, mais apparaissent généralement environ 3 jours après le traitement et atteignent leur maximum au bout de 2 à 3 semaines. Par la suite, ils diminuent progressivement et, après environ 1 mois, de légères rides d'expression peuvent réapparaître, donnant un aspect plus naturel.
- Des ecchymoses localisées peuvent apparaître après un traitement au Botox, mais elles disparaissent généralement en 7 à 10 jours et ne constituent pas un motif d'inquiétude.
- Si du Botox a été injecté autour des yeux, évitez de vous allonger pendant environ 4 heures après l'intervention afin de contribuer à prévenir l'affaissement des paupières.

Botox anti-rides

- Après un traitement autour des yeux, votre sourire peut sembler légèrement peu naturel au début.
- Le Botox au niveau du front peut provoquer une sensation de lourdeur au niveau des sourcils, un léger inconfort lors de l'ouverture des yeux ou un affaissement des sourcils. Ces effets s'améliorent généralement à mesure que le traitement se stabilise.

Botox de la mâchoire (masséter)

- Le Botox agit en réduisant l'activité musculaire. Pour le Botox de la mâchoire, les effets apparaissent après environ 3 à 4 semaines et atteignent leur maximum après 2 à 3 mois.
- Si un second traitement est nécessaire, il est généralement programmé 4 à 6 mois après le premier. Veuillez vous présenter à la date prévue afin d'évaluer votre état et de recevoir un traitement complémentaire si nécessaire.
- Après une injection de Botox dans les masséters, évitez les activités qui sollicitent excessivement les muscles de la mâchoire, comme mâcher du chewing-gum ou consommer des aliments durs tels que du calmar séché ou du jerky. Cela aidera à maintenir plus longtemps la réduction du volume musculaire.



- Dans certains cas, vous pouvez ressentir une diminution de la force de mastication pendant environ 1 mois après l'intervention, mais celle-ci revient généralement à la normale avec le temps.

Produits de comblement

- Des ecchymoses peuvent apparaître après un traitement par produit de comblement, mais elles disparaissent généralement en 7 à 10 jours et ne constituent pas un motif d'inquiétude.
- Prenez régulièrement les médicaments prescrits, aux horaires prévus.
- Un gonflement est fréquent après des injections de produits de comblement, mais la zone traitée se stabilise généralement au bout d'environ 2 semaines et prend le contour souhaité.
- Si vous présentez des symptômes tels qu'une sensation de chaleur, un gonflement important, une douleur persistante, des changements de couleur de la peau, des cloques ou des pustules, veuillez contacter la clinique et vous y rendre immédiatement.



Cette page



WhatsApp

WhatsApp : +82 10 3141 4711

B1, Aratower, 3, Seocho-daero 77-gil,
Seocho-gu, Séoul

consult@made-young.co

