

Mini-lifting du visage Précautions postopératoires

- Veuillez **portez le bandage compressif en continu pendant 24 heures** le jour de l'intervention, puis **pendant 12 heures par jour les 7 jours suivants**.
- Le 3e jour postopératoire, veuillez retirer le ruban adhésif de la zone opérée.
- Dans le cas d'un mini-lifting, **les fils de suture** sont généralement retirés **7 à 14 jours après l'intervention**.
- Après un lifting, veuillez **retirer la gaze le 1er jour postopératoire et le pansement DuoDERM le 3e jour postopératoire**.
- **Veuillez éviter d'ouvrir grand la bouche ou de manger des aliments durs pendant 2 semaines, ainsi que les mouvements excessifs du visage pendant 1 mois.**
- Toute marque au niveau de la zone traitée s'estompera progressivement au fil des semaines, bien que la vitesse d'amélioration puisse varier d'une personne à l'autre.
- Dans de rares cas, un gonflement autour de la région des glandes salivaires peut survenir, mais il **s'améliore généralement en une semaine**.
- Vous pouvez temporairement ressentir des symptômes tels que des douleurs aux tempes ou au cuir chevelu, une légère extrusion des fils, la perception des cônes sous la peau ou une sensation de pincement, mais ces symptômes s'améliorent généralement progressivement au cours de plusieurs semaines.
- À partir du 3e jour postopératoire, veuillez vous laver les cheveux en inclinant la tête vers l'arrière afin d'éviter de faire gonfler la zone opérée. Après le shampoing, **séchez soigneusement la zone à l'air froid** puis appliquez la pommade prescrite. Vous pouvez vous laver les cheveux la tête penchée vers l'avant après 3 semaines.



Consignes générales de soins postopératoires

- **La consommation d'alcool et le tabagisme sont strictement interdits pendant un mois** après l'intervention, car ils peuvent **provoquer des saignements et une inflammation**.
- Appliquez **des compresses froides pendant les 3 premiers jours** après l'intervention. **À partir du 4e jour, appliquez des compresses chaudes pendant une durée maximale d'un mois** afin de contribuer à réduire le gonflement et les ecchymoses.
- **La marche aide considérablement à réduire le gonflement. Vous pouvez reprendre une activité physique régulière un mois après l'intervention.**
- Évitez de baisser la tête après l'intervention. **Pendant la première semaine, dormir sur le dos, le haut du corps surélevé**, aidera à réduire le gonflement. Si une position trop redressée est inconfortable pour dormir, ajustez l'élévation à un niveau qui vous convient.
- **Le gonflement et les ecchymoses s'intensifient généralement au cours des 3 premiers jours après l'intervention**, puis s'améliorent lentement au cours des 2 à 4 semaines suivantes. La récupération peut varier en fonction de facteurs individuels tels que l'environnement, l'alimentation, la circulation sanguine, le type de peau et les soins postopératoires.
- **Ne prenez pas d'aspirine ni de vitamine E** pendant la semaine suivant l'intervention, car ils **peuvent augmenter le risque de saignement**.
- Veuillez prendre tous les médicaments prescrits régulièrement et aux horaires indiqués après votre sortie de la clinique. Si vous présentez des symptômes tels que de la diarrhée ou de l'urticaire après avoir pris un médicament, veuillez contacter la clinique.
- Si vous présentez soudainement un gonflement important, une sensation de chaleur, des douleurs ou des changements de couleur de la peau, veuillez contacter immédiatement la clinique.





Cette page



WhatsApp

WhatsApp : +82 10 3141 4711

B1, Aratower, 3, Seocho-daero 77-gil,
Seocho-gu, Séoul

consult@made-young.co

